

Листовка: Информация за пациента

**ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg прах за перорален разтвор
DIALGIN JUNIOR 250 mg powder for oral solution**

Метамизол натрий монохидрат / Metamizole sodium monohydrate

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg
3. Как да приемате ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20100349
Одобрение №	1-31246 / 03-11-2015

1. Какво представлява ДИАЛГИН ДЖУНИОР и за какво се използва

ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg е обезболяващ и понижаващ температурата лекарствен продукт и се използва при:

- понижаване на висока температура;
- повлияване на умерено до силно изразени болки при главоболие, зъбобол, невралгии, неврити, мускулни болки, травми, хирургични операции, изгаряния, при жлъчни, чернодробни и бъбречни колики, болезнена менструация, болки при онкологични заболявания;
- други силни остри или хронични болки, когато други терапевтични мерки са противопоказани или неефективни.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg

Не приемайте ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към метамизол натрий или към някоя от останалите съставки на ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg.
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към вещества, наречени пиразолонови производни
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към аспирин или други пронивовъзпалителни лекарствени продукти, имате обриви, астма
- при заболявания на кръвотворната система
- при заболявания на костния мозък
- при порфирия (наследствено заболяване с нарушение на червените кръвни клетки)



- при генетичен дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа
- при бременност и кърмене
- при деца под 10 годишна възраст

Обърнете специално внимание при употребата на ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg ако Вие страдате от :

- Стомашно-чревни заболявания (язва, кървене, перфорация)
- Нарушена бъбречна функция
- Високо кръвно налягане
- Задръжка на течности и оток
- Нарушена чернодробна функция
- Тежки инфекциозни заболявания
- Едновременно използване с лекарствения продукт хлорпромазин

Други лекарства и ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

- Плазмените нива на циклоспорин са намалени при едновременно приложение с метамизол.
- Метамизол може да намали ефектите на лекарства понижавачи, кръвното налягане (АСЕ инхибитори).
- Метамизол може да повиши литиевите плазмени концентрации и да предизвика литиева токсичност.

ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg с храни, напитки и алкохол

Да не се приема едновременно с алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg не трябва да се употребява по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

При високи дози не се препоръчва шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg

Винаги приемайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Трябва да се прилага възможно най-ниската доза, която води до понижение на температура и овладяване на болката.

Съдържанието на 1 саше се разтваря в чаша с вода и се изпива.

Обичайната доза е:

При деца и юноши над 12 годишна възраст


Препоръчва се по 1-2 сашета 1 – 3 пъти дневно.

Деца от 10 до 12 годишна възраст

Препоръчва се по 1- саше 1 – 3 пъти дневно.

При пациенти с остра бъбречна недостатъчност дозата на Диалгин джуниор 250 mg трябва да се намали.

Ако сте приели повече от необходимата доза ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg



Може да се наблюдава гадене, повръщане, отпадналост, световъртеж, рязко понижаване на кръвното налягане, смущения в сърдечния ритъм, задух, студена пот, промяна в цвета на кожата. Незабавно потърсете лекарска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg

Потърсете за съвет Вашия лекар или фармацевт.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Посочената по-долу честота е тази, с която са съобщавани нежеланите реакции.

Нечести (срещат се при по-малко от 1 на всеки 100 пациенти)

- сърбеж, кожен обрив (виолетов до тъмно червен обрив, понякога придружен с образуване на мехури);
- понижение на кръвното налягане, чиито прояви са учестен пулс, бледност, изпотяване, треперене, замаяност, гадене, загуба на съзнание. Рискът от значимо спадане на кръвното налягане се повишава при много висока температура.

Редки (срещат се при по-малко от 1 на всеки 1 000 пациенти)

- кожни обриви, тежки алергични реакции, които могат да се проявят с оток на лицето, езика или гърлото, недостиг на въздух и хриптене в гърдите, спадане на кръвното налягане;
- понижение броя на белите кръвни клетки, точковидни кръвоизливи по кожата и лигавиците, анемия;
- гърчове след прием на високи дози.

Много редки (срещат се при по-малко от 1 пациент на всеки 10 000 пациенти)

- значително намаление броя на белите кръвни клетки и свързано с това намаление на устойчивостта Ви към инфекции (вижте Предупреждения и предпазни мерки);
- значително намаление броя на кръвните плочици (тромбоцити), което се проявява с повишена склонност към кървене и поява на точковидни кръвоизливи по кожата и лигавиците;
- тежки кожни увреждания и реакции, напр. поява на мехури по кожата на ръцете, краката и стъпалата, по-рядко по устните, лицето и половите органи;
- астматичен пристъп (недостиг на въздух и хриптене в гърдите);
- нарушения на функцията на бъбреците, поява на белтък в урината, намаление на количеството отделяна урина;
- повишение на стойностите на билирубина в кръвта.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

- гадене, повръщане, намален апетит;
- виене на свят;
- учестена сърдечна дейност, посиняване на кожата на пръстите, носа, около устните, лигавиците;
- жълтеница.

Съобщаване на нежелани реакции



Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез

Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 28903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ДИАЛГИН ДЖУНИОР

Да се съхранява при температура под 25° С.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност: 3 години.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg

- Активното вещество е: метамизол натрий 250 mg
- Другите съставки са: манитол, колоидален силициев диоксид, натриев циклакат и ягодов аромат.

Как изглежда ДИАЛГИН ДЖУНИОР 250 mg и какво съдържа опаковката
Саше с прах за перорално приложение, картонената кутия съдържа 5 броя сашета

Притежател на разрешението за употреба и производител

Химакс Фарма ЕООД

ул. Горица № 8А, 1618 София, България

тел.: 02 856 31 43

факс: 02 955 42 78

имейл: info@chemaxpharma.com

Дата на последно преразглеждане на листовката: октомври 2015 г.

